



ຍຸດທະວິທີ ການລຸດຜ່ອນ ອັນຕະຮາຍ

ການລຸດຜ່ອນອັນຕະຮາຍແມ່ນຫຍັງ?

ມັນມີຫລາຍໆຢ່າງທີ່ເຮົາສາມາດຊ່ວຍຢູ່ດິນແຮງແລະຢູ່ຢ່າງແຮງຖ້າຫາກວ່າທ່ານໃຊ້ຢາເສບຕິດ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ຢາກຈະອອກຢາ, ຫລືບໍ່ແນໃຈວ່າທ່ານຢາກຈະອອກຫລືບໍ່, ພາກປະຕິບັດການລຸດຜ່ອນອັນຕະຮາຍສາມາດຊ່ວຍໄດ້. ຢູ່ໃນການລຸດຜ່ອນອັນຕະຮາຍຈຸດເປົ້າໝາຍແມ່ນ “ການປ່ຽນແປງໄປໃນທາງດີຕ່າງໆ (ແລະທ່ານຕັດສິນໃຈເວົ້າວ່າມັນໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ.

ເພື່ອນຝຸງໂຮກຕິດຢາເສບຕິດ

Substance Use Disorder (SUD) (ເພື່ອນຝຸງໂຮກຕິດຢາເສບຕິດ) ສາມາດຊ່ວຍເຫລືອທ່ານຊອກຫາການປິ່ນປົວ, ຫລືຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສິ່ງເສີມສຸຂະພາບແລະຄຸນນະພາບຂອງອິດິດຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ເວົ້າເຈົ້າຍັງມີປະສິດປະການນຳໂຮກຕິດຢາເສບຕິດແລະສ່ວນຫລາຍແລ້ວແມ່ນຢູ່ໃນການພັກພັນ. ເພື່ອນຝຸງ SUD ຊຶ່ງຮູ້ທ່ານໃນການເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໄປໃນທາງດີ. ຊອກຫາເພື່ອນຝຸງ SUD ຢູ່ໃນຈຸດຊອກຫາ MOUD ໂດຍຕິດຕາມລິງຄ໌ນີ້: warecoveryhelpline.org/moud-locator/

Syringe Service Programs (SSPs) (ໂຄງການບໍລິການເອີ້ນສັກຢາ)

ໂຄງການສາມາດຊ່ວຍບຸກຄົນທີ່ໃຊ້ຢາເສບຕິດໃຫ້ຢູ່ດິນແຮງ. SSPs ຈະເອົາເອີ້ນສັກຢາທີ່ສະອາດໃຫ້ແລະອຸປະກອນການສັກຢາ, ກ່ອງຖິ້ມເອີ້ນສັກຢາ, ຢານາໂລຊອມ, ແລະການເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ. ໂຄງການເຫລົ່ານີ້ຈະມີການກວດຝຣີເບິ່ງໂຮກ HIV ແລະ hepatitis C ຢູ່ສະເມີ. ຊອກເບິ່ງເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ SSPs ແລະຊອກຫາໜ້ອງການທີ່ກ່ຽວກັບໄດ້ທີ່ doh.wa.gov/SSPDirectory.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານສັກຢາເສບຕິດມັນມີຍຸດທະວິທີຂອງການສັກຢາທີ່ສາມາດລຸດຜ່ອນການສ່ຽງອັນຕະຮາຍຂອງທ່ານລົງ. ທ່ານສາມາດອ່ານເບິ່ງກ່ຽວກັບເຮືອງນີ້ຢູ່ທີ່: nextdistro.org/saferinjection

ການປິ່ນປົວໂຮກ Hepatitis C

ຢູ່ໃນຮັດວໍຊິງຕັນ, ທຸກໆຄົນທີ່ມີ Medicaid ສາມາດໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຝຣີສຳລັບໂຮກ hepatitis C. ການປິ່ນປົວໃຫມ່ລ່າສຸດຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະ ດົນນານເຖິງສອງເດືອນ, ຈະບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນຫລືມີໜ້ອຍໜຶ່ງ, ແລະໃຊ້ໄດ້ຜົນ — ເກືອບຫມົດທຸກໆຄົນທີ່ຖືກປິ່ນປົວຖືກປົວຫາຍ!

ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອນຳການເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວໃຫ້ແວ່ເຂົ້າຢ້ຽມ ພວບໂຊທ໌ອັນນີ້: hepeducation.org/what-we-do/medical-case-management

ການກວດເບິ່ງແລະການປ້ອງກັນໂຮກ ກວດເບິ່ງແລະການປ້ອງກັນໂຮກ HIV

ສຳລັບສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ເຮົາເຮັດເພື່ອການກວດເບິ່ງໂຮກ HIV ທ່ານສາມາດຊອກຫາໃນທີ່ຢູ່ແວບບ່ອນນີ້: bit.ly/HIV_testing

ມັນມີຢາທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໂຮກ HIV ໄດ້ກ່ອນຫລືຫລັງຈາກການຕິດສົມຜົນທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມຢູ່ໃນແຜນແຮງຂອງ DOH ໄດ້ທີ່: Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) bit.ly/DOH_PrEP ແລະ PrEP Drug Assistance Program (PrEPDAP) bit.ly/DOH_PrEPDAP

ຢາກຈະອອກ, ຕັດລົງ, ຫລືທຳການປ່ຽນແປງບໍ່?

ມັນມີທາງເລືອກສຳລັບການປິ່ນປົວ ແລະການຊຸ້ມຊື້ໄວ້ໃຫ້ຢູ່ໃນຮັດວໍຊິງຕັນ.



HCA 82-0376 LA (12/21) Laotian

ລູກການສ່ຽງຕໍ່ການເສັຽຊີວິດຂອງທ່ານລົງຈາກການໃຊ້ຢາຫລາຍເກີນໄປໂດຍການຖືຢານາໄລໂຊນໄປນຳ

- ບອກໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ຈັກນຳວ່າເຈົ້າເກັບ Naloxone ໄວ້ຢູ່ໃສ
- ຮຽນຮູ້ວ່າຈະຕອບໄຕ້ຕໍ່ການໃຊ້ຢາຝືນຫລາຍເກີນຂອບເຂດໄດ້ຢ່າງໃດແລະ ຜລກປ່ຽນການຝຶກຝົນກ່ຽວກັບການໃຊ້ຫລາຍເກີນໄປນຳຫມູ່ເພື່ອນ
- ຄຳຜະນະນຳສຳລັບການໃຊ້ **Naloxone** (ຫນັງສື) ຫລື bit.ly/Naloxone_Instructions
- ຄຳຜະນະນຳສຳລັບການໃຊ້ **Naloxone** (ວີດີໂອ) vimeo.com/357020563
- ຊອກຫາ **naloxone** ໄດ້ຢ້ານທ່ານຫລື bit.ly/Find_Naloxone

ລູກການສ່ຽງຕໍ່ການໃຊ້ຫລາຍເກີນໄປຂອງທ່ານລົງໂດຍການກວດເບິ່ງປະຣິມານຂອງທ່ານແລະການບໍ່ໃຊ້ໂດຍລຳໝັ້ງ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໃຊ້ຢາເມັດຫລືຢາເສບຕິດແນວອື່ນຈາກທ້ອງຖະນົນ,ອິນເຕີ ແນດ, ຫລືຫມູ່ເພື່ອນ,ທ່ານຄວນຈະຄິດວ່ານັ້ນມີສາມແຜນຕາມີລູນຳ.ແຜນຕາ ມີລູ ແມ່ນ 50-100x ເທື່ອແຮງກວ່າເຮືອອື່ນ.ການໃຊ້ແຜນຕາມີລູຫລາຍເກີນໄປຈະໄວ.ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໃຊ້ແຜນຕາແນວນຶ່ງໃຫ້ຕັ້ງເງື່ອນໄຂຂອງຄວາມປອດພິດໄວ້ເນື້ອເປັນໄປໄດ້.

ເລີ້ມຕົ້ນຈຳນວນນ້ອຍແລະໄປຊ້າໆ:

- ໃຊ້ຈຳນວນນ້ອຍໆຫລືຂະນາດທົດລອງ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໃຊ້ຢາຫລາຍເກີນກວ່າຢ່າງນຶ່ງ,ໃຊ້ຢາແນວນຶ່ງໃນເທື່ອນຶ່ງຫລື ໃຊ້ຢາແຕ່ລະຢ່າງຫນ້ອຍນຶ່ງ.

ໃຊ້ຮະບົບເພື່ອນຝູງ:

- ຖ້າຫາກວ່າທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້,ຫລືກວ່ານການໃຊ້ຢາແນວດຽວແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີຄົນໃດຄົນນຶ່ງຢູ່ໃກ້ທ່ານທີ່ມີຢານາໄລໂຊນ.
- ມີຫມູ່ເພື່ອນຫລືຄົນໃດຄົນນຶ່ງຜູ້ທີ່ທ່ານເຊື່ອໃຈຈອບຝັງເບິ່ງທ່ານ (ກວດເບິ່ງ, ໂທຫາ,ຫລືແວ່ຢ້ຽມ)
- ໃຊ້ຢາຢູ່ບ່ອນທີ່ຄົນໃດຄົນນຶ່ງຈະພົບເຫັນທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍໆຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
- ໃຊ້ສັນຍາເຕືອນຫລືເວລາທີ່ຄົນອື່ນສາມາດໄດ້ຍິນແລະຈະຕອບຄືນຖ້າຫາກວ່າທ່ານໃຊ້ຫລາຍເກີນໄປ
- ໃຊ້ການບໍລິການປົກປັດປ້ອງຄວາມລັບເຊັ່ນວ່າ neverusealone.com, ໂດຍ ການໂທຫາ(800) 484-3732, ຫລື Brave app

Medications for Opioid Use Disorder (MOUD)

Opioid use disorder (OUD) ເປັນສະພາບພະຍາບານຮະຍະຍາວ,ເປັນປົວໄດ້.ຢາສຳລັບໂຮກຢາຝືນຈະໃຊ້ໄດ້ຜົນດີແລະເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການພັກຜ່ອນສຳລັບຫລາຍໆຄົນ. ມັນມີຢາສາມແນວທີ່ຖືກອະນຸມັດເພື່ອຈະປົວ OUD. ເບິ່ງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ.

ຢາປົວຢາຝືນທີ່ຖືກອະນຸມັດ		
Buprenorphine	Methadone	Naltrexone
ມັນຈະເຮັດວຽກແນວໃດ?		
ຄວບຄຸມນຳອາການການຫົວໄຫຍແລະ ການຖອນຕົວໂດຍການເຮັດຕາມວິທີການນຳຢາຝືນ	ຄວບຄຸມນຳອາການການຫົວໄຫຍແລະ ການຖອນຕົວໂດຍການເຮັດຕາມວິທີການນຳຢາຝືນ	ຢາຕ້ານຢາຝືນ,ທ່ານຈະບໍ່ຮູ້ສຶກຜົນສະທ້ອນຂອງ Opioids. ຄວບຄຸມການຫົວໄຫຍສຳລັບບາງຄົນ
ມັນຈະລຸດຜ່ອນອັນຕະຣາຍແລະເຮັດໃຫ້ການສ່ຽງຕໍ່ການເສັຽຊີວິດຂອງອ້ອຍລົງບໍ່? ໂດຍອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຕິດຕາມຜົນອອກມາຢູ່ໃນໂລກຕົວຈິງ		
ລູກການສ່ຽງຕໍ່ການເສັຽຊີວິດໂດຍ 50%	ລູກການສ່ຽງຕໍ່ການເສັຽຊີວິດໂດຍ 50%	ບໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈະລຸດການສ່ຽງຕໍ່ການເສັຽຊີວິດລົງ
ມັນຈະກຸ້ມໄດ້ດີນານເທົ່າໃດແລະອ້ອຍຈະໃຊ້ມັນແນວໃດ?		
ມີຜົນດີນານປະມານ 24 ຊົ່ວໂມງ,ຕາມປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ທາງປາກ (ຝັງໃນຫນັງຫລືການສັກຢາອາດເປັນໄປໄດ້)	ມີຜົນດີນານປະມານ 24 ຊົ່ວໂມງ,ໃຊ້ ທາງປາກ	ການສັກຢາມີຜົນດີນານປະມານ 28 ວັນ,ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ Opioids ແນວໃດ Opioids ເປັນ ເວລາ 7-10 ວັນກ່ອນການ ເລີ້ມຕົ້ນ
ອ້ອຍສາມາດໄດ້ຮັບການສັກຢາຢູ່ໃສ,ແລະ ວິທີການດຳເນີນການແມ່ນຫຍັງ?		
ການປະຖົມພະຍາບານ,ຫ້ອງການພະຍາບານ,ໂຄງການອຸມຸນຊົນ,ແລະ OTPs ບາງຢ່າງອຸບປະສັກກິດກິນຕຳ,ທາງເລືອກເອົາການເລີ້ມຕົ້ນໃນວັນດຽວກັນກໍມີໃຊ້ໄດ້.ການ ຢ້ຽມຢາມຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຈາກແຕ່ລະວັນໄປຫາແຕ່ລະເດືອນແລະອາດຈະຖືກປົງໃຫ້ມີຫມາຍນັດທີ່ຖືກນັດໄວ້ແລ້ວໂດຍອີງຕາມວ່າທ່ານຈະໄປໃສ.	ຖືກສັ່ງຊື້ໄດ້ເທົ່ານັ້ນຢູ່ນຳ opioid treatment programs (OTPs)ໂຄງການທີ່ມີໂຄງຮ່າງຢ່າງເຂັ້ມແຂງ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນໄປຄລິນິກຫລາຍໆວັນໃນແຕ່ລະອາທິດ,ແຕ່ວ່າອະຍະຫ່າງສາມາດລຸດລົງຕາມເວລາຜ່ານໄປ	ຖືກສັ່ງຊື້ແລະເອົາໃຫ້ໂດຍທ່ານຫມໍພະຍາບານແລະ OTPs ບາງບ່ອນການຢ້ຽມຢາມຫມໍແຕກຕ່າງກັນໄປແຕ່ລະອາທິດໄປຫາແຕ່ລະເດືອນ
ອ້ອຍຈະຕ້ອງການການປຶກສາຫລືການກວດເບິ່ງຢາເສບຕິດບໍ່?		
ທ່ານຫມໍສ່ວນຫລາຍຍິ່ງໃຫ້ມີການກວດເບິ່ງນ້ຳຍ່ຽວ,ບາງຄົນຍິ່ງໃຫ້ມີການປຶກສາ	ຍິ່ງໃຫ້ມີການກວດເບິ່ງນ້ຳຍ່ຽວແລະ ການປຶກສາເປັນປະຈຳ	ທ່ານຫມໍບາງຄົນຍິ່ງໃຫ້ມີການກວດເບິ່ງນ້ຳຍ່ຽວແລະການປຶກສາ

(ເອົາມາຈາກ UW ADAl) ເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຢາເຫລົ່ານີ້,ແວ່ຢ້ຽມ: learnabouttreatment.org/

ຊອກຫາຢາໄກ້ຢ້ານທ່ານໄດ້ຢູ່ແວບໂຊທ໌ ບ່ອນນີ້: warecoveryhelpline.org/moud-locator/ ຫລືໂທຫາ 1-866-789-1511.